

Guide d'identification faune du sol

Absence de pattes articulées

✓ corps annelé, taille du corps > 4mm


> corps épais

larves de diptères,
d'hyménoptères,
de charançons



> corps fin

vers de terre



*Pour aller plus
loin voir fiche vers*

✓ corps non annelé

> avec coquille escargot



> sans coquille limace



Présence de pattes articulées

✓ 3 paires de pattes

Voir page suivante

✓ 4 paires de pattes

> corps en une partie

-- pattes longues et fines, corps arrondi en une partie : opilions



-- pattes courtes et corps inférieur à 4mm : acariens, araignées rouges



> corps en 2 parties araignées



✓ Plus de 4 paires de pattes

> corps de forme ovale et aplatie, 7 paires de pattes : cloportes




> corps avec plus de 7 paires de pattes : myriapodes

-- corps aplati, 1 paire de pattes par segment du corps : myriapodes
chilopodes



-- corps cylindrique, 2 paires de pattes par segment de corps :
myriapodes diplopodes



Guide d'identification faune du sol

Présence de pattes articulées – 3 paire de pattes

✓ sans ailes, longueur inférieure à 4mm

> **corps allongé** : collemboles arthropléones



> **corps globuleux** : collemboles symphyléones



✓ sans ailes et corps allongé (larvaire), longueur supérieure à 4mm

> **corps avec seulement 3 paires de pattes** : larve de coléoptères (carabes, staphylins, scarabées, élatéridés,...)



> **corps avec 3 paires de pattes et des fausses pattes** : larve de lépidoptère



✓ avec ou sans ailes visibles, longueur supérieure à 4mm

> **avec organe piqueur suceur (trompe)**

-- antennes coudées, corps arrondi : charançons



-- première paire d'ailes coriaces et membraneuses : punaises, gendarmes



-- tête triangulaire, organisme qui saute : cicadelles, cercopes



> **absence d'organe piqueur suceur**

-- taille de guêpe (resserrement entre thorax et abdomen) : fourmis




-- pattes arrières sauteuses : orthoptères

---- antennes longues : sauterelles



---- antennes courtes : criquets, grillons

-- présence de pinces en arrière du corps : pince-oreille



-- paire d'élytres (ailes coriaces) visibles : coléoptères

---- paire d'élytres qui ne recouvre qu'une petite partie de l'abdomen : staphylins



---- paire d'élytres striés, liaison rigide entre thorax et abdomen : carabes



---- forme ovale allongée : élatéridés



---- corps arrondi, pattes avec crochets : scarabées




---- corps arrondi : coccinelles






QU'EST-CE QUE LE CLITELLUM ?

Il s'agit d'un anneau coloré situé dans le premier tiers du corps du ver de terre. Il permet de reconnaître les adultes.





QU'EST-CE QUE LE CLITELLUM ?

Il s'agit d'un anneau coloré situé dans le premier tiers du corps du ver de terre. Il permet de reconnaître les adultes.



QU'EST-CE QUE LE CLITELLUM ?

Il s'agit d'un anneau coloré situé dans le premier tiers du corps du ver de terre. Il permet de reconnaître les adultes.

